



FASE FENOLOGICA:
da Seconda foglia distesa (BBCH 12) a
quinta foglia distesa (BBCH 15)
(Fonte: SFR)

Tendenza: Dal pomeriggio di domenica attesi i primi temporali pomeridiani, in ulteriore peggioramento nella giornata di lunedì.

<https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali MEDIA VALLE DEL TEVERE, ORVIETANO E VALLE UMBRA SUD, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

In previsione di possibili piogge da domenica pomeriggio ad inizio prossima settimana si consiglia di intervenire in assenza di copertura antiperonosporica, dove i germogli hanno raggiunto o superato i 10 cm, con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Dimetomorf, Mandipropamide, Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb) abbinati a prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico Spiroxamina, Meptildinocap, Zolfi bagnabili.

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria, in attesa della prossima pubblicazione del Disciplinare di difesa integrata 2022-2023, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2021/2022, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>