



**FASE FENOLOGICA:**

Infiorescenze pienamente sviluppate, fiori tra loro separati (BBCH 57); Piena fioritura, 50% delle caliptrite cadute (BBCH 65). (Fonte: SFR)



Tendenza: Tempo ancora instabile, soprattutto nelle ore pomeridiane

<https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali MEDIA VALLE DEL TEVERE, ORVIETANO E VALLE UMBRA SUD, si rappresenta la seguente situazione:

**PERONOSPORA**

Presenza di sintomi di lieve intensità e diffusione nei Comuni di Magione, Montefalco, Orvieto. In considerazione dell'instabilità climatica si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Dimetomorf, Mandipropamide, Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb), Metalaxil-M, Fluopicolide, ecc.. abbinati a prodotti di copertura.

**OIDIO**

Abbinare al trattamento antiperonosporico Spiroxamina, Zolfi bagnabili, IBE ecc.

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2022/2023, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>