



FASE FENOLOGICA:
Chiusura grappolo, acini cominciano a toccarsi (BBCH 77); Grappolo chiuso (BBCH 79).

Tendenza: Tempo instabile da venerdì fino a sabato. Domenica e lunedì nuova fase di tempo stabile, con temperature in progressivo aumento. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali MEDIA VALLE DEL TEVERE, ORVIETANO E VALLE UMBRA SUD, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Presenza di sintomi di media intensità su foglia e grappolo, nei Comuni di Magione, Montefalco, Orvieto, Umbertide,

In considerazione di possibili piogge si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Dimetomorf, Mandipropamide, Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb), Cymoxanil ecc.. abbinati a prodotti di copertura privilegiando prodotti rameici.

OIDIO

In assenza di copertura antioidica abbinare al trattamento antiperonosporico Zolfi bagnabili, IBE, Metrafenone, Cyflufenamide ecc.

BOTRITE

Su cultivars a grappolo compatto ed in zone recettive sono possibili interventi in pre-chiusura grappolo con antibotritici specifici riportati nel relativo disciplinare di produzione integrata

TIGNOLETTA DELLA VITE

Fase crescente del volo della 1° generazione carpfaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2022/2023, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>