



**Fase fenologica: Ingrossamento dei frutti.** Le drupe raggiungono quasi le dimensioni definitive (BBCH:79)



**Tendenza:** La rimonta dell'alta pressione darà luogo ad un progressivo miglioramento del tempo sull'Italia ad inizio della prossima settimana. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>

Il monitoraggio delle trappole a ferormone ha evidenziato un aumento consistente delle catture, questo dato associato alle mutate condizioni climatiche, determina la necessità **di alzare il livello attenzione**, si suggerisce pertanto di effettuare il campionamento delle drupe a livello aziendale, per valutare l'effettivo raggiungimento della soglia di intervento.

**Si ricorda che le soglie di intervento sono:**

Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture.

Per le olive da olio: in funzione delle varietà 4-5 % di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve)

## Consigli di difesa

- È opportuno **continuare** con l'applicazione degli antideponenti, adalticida o repellenti indipendentemente dall'indirizzo di difesa adottato a livello aziendale, preventiva o curativa al fine di contenere la presenza degli adulti, **da effettuare sempre dopo le piogge**.
- Effettuare il campionamento aziendale settimanalmente per valutare l'eventualità di effettuare i **trattamenti ovo-larvicida**
- **Consultare il "Disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria per l'annata 2022/2023 (<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>)** per le sostanze attive ammesse.
- **Ricordiamo** che l'efficacia dei prodotti larvicidi si aggira intorno ai 15 gg, quindi i trattamenti vanno effettuati **solo al raggiungimento della soglia d'intervento** e che, il disciplinare di difesa integrata prevede al massimo due interventi
- Il suggerimento, alla luce dell'attuale andamento climatico estremamente favorevole alla diffusione del fitofago, è di **continuare con l'utilizzo di antideponenti, adalticida o repellenti e di perseguire anche dopo l'eventuale intervento con prodotti ovo-larvicida, in considerazione del limitato numero di interventi ammessi**.
- Ad oggi il prodotto che ha dato i migliori risultati per il controllo degli adulti, è lo Spinosad - Dose di utilizzo: 5lt di soluzione ad ha (1litro di prodotto commerciale sciolto in 4 litri d'acqua). Il trattamento va eseguito quando le mosche sono presenti, per contenere l'ovideposizione, dopo eventi piovosi e in coincidenza con la riduzione delle temperature Si ricorda che sono ammessi n.8 interventi a stagione.

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2022/2023, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dell'olivo sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>