



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 4 del 28/05/2018

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica: Bottoni fiorali separati (BBCH: 57)



Bottoni fiorali separati

I bottoni fiorali dell'infiorescenza a grappolo sono nettamente isolati.

**Codice
BBCH: 57**



Fase fenologica: Fonte RETERURALE (<https://www.reterurale.it/documentifeno>)

PERONOSPORA

Segnalata presenza di peronospora con bassa diffusione a Narni, Orvieto, Montefalco e Magione.

Si consiglia, in presenza di possibili infezioni secondarie, di intervenire con prodotti preferibilmente endoterapici quali: CAA (Mandipropamide, Dimetomorph, Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb), Fluopicolide, Acilalanine (Metalaxil-m, Benalaxil-m ecc.), associati a prodotti di copertura.

OIDIO

Per chi non avesse effettuato il 2° intervento si consiglia di intervenire preferibilmente con Meptildinocap, Spiroxamina, Bupirimate, IBE, ecc.

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2017/2018, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/12682939/Disciplinare+Difesa+Integrata+2018+COLT+URE+FRUTTICOLE.pdf/d715a3d7-0087-4be4-8cc0-ef3cc52c3c2d>