



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 13 del 10/08/2018

PERUGIA E TERNI



**Fase fenologica: BBCH 85: Addolcimento acini
- BBCH 82: 50% degli acini è invaiato**

Fonte RETERURALE

(<https://www.reterurale.it/documentifeno>)

PERONOSPORA

Presenza di peronospora nell'area del Trasimeno, Narni, Orvieto, Montefalco, Colli Perugini-Torgiano (Dati Progetto *Smartmeteo* - <http://cratia.it/smartmeteo/>). In presenza di prolungate bagnature e peronospora in fase di sporulazione su foglie giovani possibile un intervento di chiusura preferibilmente con prodotti rameici in funzione della persistenza delle s.a. utilizzate nel precedente trattamento fitosanitario altrimenti non si consigliano interventi.

OIDIO

Si consiglia di intervenire con zolfo bagnabile o in polvere non oltre la fase fenologica dell'invaiaitura in presenza di inoculo del micete.

TIGNOLETTA DELLA VITE

Nella settimana dal 03.08.2018 al 09.08.2018 i voli sono aumentati, in modo particolare nella provincia di Terni. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve. I prodotti fitosanitari impiegabili sono riportati nel disciplinare di difesa integrata valido per l'anno 2017-2018.

Si ricorda che la s.a. clorpirifos-etile si può impiegare soltanto in pre-fioritura come da nuova etichetta.

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria il Disciplinare di difesa integrata per l'anno 2017-2018 è disponibile al seguente link:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/12682939/Disciplinare+Difesa+Integrata+2018+COLT+URE+FRUTTICOLE.pdf/d715a3d7-0087-4be4-8cc0-ef3cc52c3c2d>