

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.4 DEL 11.05.017- PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : da BBCH 14 (4 foglie separate) a 55 (grappoli separati)-
57 (Bottoni fiorali separati)

PERONOSPORA

Possibile evasione infezione primaria verificatasi in data 28.04.2017.

Ulteriore possibile infezione primaria verificatasi con piogge cadute dal 06 al 08.05 su tutto il territorio regionale.

In previsione di possibili piogge si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, laddove la vegetazione ha superato i 10 cm (in considerazione dei danni da gelata), con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropanide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , Fenilammidi (metalaxil, metalaxil-m. benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, associati a prodotti di copertura .

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE.

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Il Dirigente Vicario
Dr Francesco Grohmann