



**FASE
FENOLOGICA (BBCH: 01- 03)**



Inizio dell'ingrossamento delle gemme: le gemme iniziano a rigonfiarsi all'interno delle perule che le racchiudono - **Fine dell'ingrossamento delle gemme:** le gemme sono rigonfie ma non ancora verdi

Fonte: *reterurale, ERSA - Baggiolini*

Mal dell'esca

Possibili interventi dopo la potatura con prodotti fitosanitari a base di *Trichoderma* spp. al fine di limitare gli attacchi dei patogeni responsabili del mal dell'esca o utilizzo di s.a. per disinfettare le ferite di potatura indicate nel Disciplinare di Difesa integrata della vite disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Per le restanti avversità della vite all'attualità non si rendono necessari interventi in considerazione della fase fenologica.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2019 -2020 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2019/2020, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>