

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.7 DEL 01.06.017- PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Fine Fioritura- Allegagione

PERONOSPORA

Segnalazione di presenza di sintomi di peronospora nelle seguenti date e località:

- 20.05 a Montefalco e Bevagna (PG)
- 26.05 a Torgiano (PG)
- 30.05 a Baschi (TR)

Possibili infezioni secondarie in presenza di prolungate bagnature .

In previsione di possibili piogge a inizio prossima settimana si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , associati a prodotti di copertura oppure le altre s.a. presenti nel disciplinare di difesa integrata (ametoctradina, amisulbrom, cyazofamide ecc) in funzione della persistenza delle s.a. utilizzate nel precedente trattamento fitosanitario.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, Bupirimate, IBE , Metrafenone, Quinoxifen, Cyflufenamide, Spiroxamina ecc....

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Agr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Il Dirigente Vicario
Dr Francesco Grohmann

