



Sviluppo delle foglie - 3 foglie spiegate.



**FASE
FENOLOGICA (BBCH 11- BBCH 14)**

**Lunghezza germogli inferiore ai 10 cm.;
4 foglie distese.**



Sviluppo delle foglie - 4 foglie spiegate.



(Fonte: reterurale, ERSA - Baggiolini)

PERONOSPORA

In considerazione delle piogge cadute, variabili dai 10 ai 20 mm, nei giorni 28 e 29 Aprile sul territorio regionale ed in considerazione di ulteriori piogge previste a metà settimana si consiglia di intervenire ad inizio prossima settimana dove i germogli hanno raggiunto i 10 cm di lunghezza con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (*mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb, acilalanine, metalaxil-m, benalaxil, benalaxil-m, ecc.*), scelti in funzione della fase fenologica raggiunta, associati a prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>