



Allegagione - Gli ovari iniziano ad ingrossarsi dopo la fecondazione. Gli stami appassiscono ma restano spesso attaccati al loro punto d'attacco.



Sviluppo degli acini - Acini delle dimensioni di un grano di pepe. I grappoli iniziano a piegarsi verso il basso.

FASE FENOLOGICA

**Allegagione (BBCH 71);
Sviluppo degli acini (BBCH 73)**

(Fonte: reterurale, ERSA – Baggiolini)

Previsioni meteo: Oggi prevista residua instabilità pomeridiana nella zona orientale. Tempo in miglioramento.

PERONOSPORA

Presenza di sporadiche macchie di peronospora nella zona di Narni, Calvi, Baschi, Orvieto, Bettona.

In presenza di eventuali prolungate bagnature intervenire preferibilmente con ametoctradina, amisulbrom, ecc. privilegiando il rame.

OIDIO

In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, zolfi bagnabili ecc, oppure zolfo in polvere.

TIGNOLETTA DELLA VITE

Iniziali catture prima generazione carpofaga.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>