



**Sviluppo degli acini** - Acini delle dimensioni di un grano di pepe. I grappoli iniziano a piegarsi verso il basso.

73

## FASE FENOLOGICA

### Sviluppo degli acini (BBCH 73)

(Fonte: *reterurale*, ERSA – Baggiolini)

## Previsioni meteo: Tempo stabile.

### PERONOSPORA

Presenza di sporadiche macchie di peronospora nella zona di Narni, Calvi, Baschi, Orvieto, Bettona.

In presenza di eventuali prolungate bagnature intervenire preferibilmente con ametoctradina, amisulbrom, ecc. privilegiando il rame

### OIDIO

In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Zolfi bagnabili ecc., oppure zolfo in polvere.

### TIGNOLETTA DELLA VITE

Fase crescente del volo della 1° generazione carpofoaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>