



(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

FASE FENOLOGICA

20% fiori aperti (BBCH 62);
Allegagione (BBCH 71);
Sviluppo acini (BBCH 73)

Tendenza: Stabile lunedì, progressivo peggioramento da mercoledì.

<http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Assenza di sintomi nelle aziende monitorate. Si sono verificate possibili infezioni primarie in conseguenza delle piogge cadute in data 27-28 maggio, in alcune località, con completamento del periodo di incubazione.

In assenza di copertura antiperonosporica, in previsione di peggioramento del tempo da mercoledì prossimo, si consiglia di intervenire con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Dimetomorf, Mandipropamide, Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb), Metalaxil- m, etc., abbinati a prodotti di copertura. Privilegiare l'utilizzo del rame dove si è verificata l'allegagione.

OIDIO

Assenza di sintomi nelle aziende monitorate. Situazione di alto rischio in base ai dati dei modelli previsionali.

In assenza di copertura antioidica abbinare al trattamento antiperonosporico IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, etc.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: [http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini fitosanitari](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari)