



(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

FASE FENOLOGICA

Allegagione (BBCH 71);
Sviluppo acini (BBCH 73-75)

Tendenza: Tempo stabile e temperature in aumento domenica ed inizio settimana scorsa.

<http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

Nell'eventualità si fossero verificate grandinate si consiglia di intervenire con rame + zolfo

PERONOSPORA

Assenza di sintomi nelle aziende monitorate. In assenza di copertura antiperonosporica si consiglia di intervenire in presenza di prolungate bagnature con prodotti preferibilmente rameici per scongiurare possibili infezioni secondarie.

OIDIO

Assenza di sintomi o lievi nelle aziende monitorate. Situazione di alto rischio in base ai dati dei modelli previsionali.

In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Zolfi bagnabili etc., oppure zolfo in polvere.

TIGNOLETTA

È terminato il volo della 1° generazione.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>