



(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

FASE FENOLOGICA

Chiusura grappoli (BBCH 77)
Invaatura (BBCH 81)

Tendenza: Permangono condizioni di stabilità con ondata di calore almeno fino a martedì.

<http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti in questa settimana dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Assenza o lievi sintomi nelle aziende monitorate. In assenza di copertura antiperonosporica si consiglia di intervenire in presenza di prolungate bagnature con prodotti preferibilmente rameici per scongiurare possibili infezioni secondarie.

OIDIO

Situazione di medio-alto rischio in base ai dati dei modelli previsionali.

In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Zolfi bagnabili etc., oppure zolfo in polvere.

TIGNOLETTA

È iniziato il volo della 1° generazione carpo-faga. Si registra un aumento delle catture.

Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: [http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini fitosanitari](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari)