



## FASE FENOLOGICA

Chiusura grappoli (BBCH 77)  
Invaiaatura (BBCH 81)

(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

### **Tendenza:**

Isolati rovesci al primo mattino sui versanti orientali della dorsale appenninica, in rapido esaurimento. Per il resto della giornata poco nuvoloso su tutta la regione, in ulteriore miglioramento del pomeriggio.

<http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti in questa settimana dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

### **PERONOSPORA**

Assenza o lievi sintomi nelle aziende monitorate. In assenza di copertura antiperonosporica si consiglia di intervenire dove si sono verificate prolungate bagnature con prodotti preferibilmente rameici associati a citotropici dove presenti sintomi.

### **OIDIO**

Situazione di medio- basso rischio in base ai dati dei modelli previsionali. In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Zolfi bagnabili ecc.... oppure zolfo in polvere.

### **TIGNOLETTA**

Fase terminale del volo della 1 generazione carpofoaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: [http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini fitosanitari](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari)