



FASE FENOLOGICA

Chiusura grappoli (BBCH 77)

Invaiaatura (BBCH 81)

(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

Tendenza:

Domenica il veloce transito sui settori adriatici di aria più fresca, proveniente dal nord Europa, provocherà un lieve calo delle temperature e qualche possibile piovasco sui rilievi principali nel pomeriggio. Da lunedì nuovo dominio dell'alta pressione africana che farà salire le temperature, con valori massimi prossimi ai 40 gradi nelle località di pianura verso metà settimana.

<http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti in questa settimana dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Assenza o lievi sintomi nelle aziende monitorate. In assenza di copertura antiperonosporica si consiglia di intervenire dove si sono verificate prolungate bagnature e in presenza di sintomi con prodotti preferibilmente rameici.

OIDIO

Situazione di medio- basso rischio in base ai dati dei modelli previsionali. In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Zolfi bagnabili ecc.... oppure zolfo in polvere.

TIGNOLETTA

Fase terminale del volo della 1 generazione carpofoaga.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: [http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini fitosanitari](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari)