



(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

## FASE FENOLOGICA

Invaiatura (BBCH 81-83)

Tendenza: Ritorna un po' di caldo.

<http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti in questa settimana dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

### PERONOSPORA

Non si consigliano interventi

### OIDIO

Situazione di basso rischio in base ai dati dei modelli previsionali. In presenza di eventuali iniziali sintomi intervenire su cultivar tardive con zolfi bagnabili oppure zolfo in polvere.

### TIGNOLETTA

In generale ridotta presenza di adulti nelle trappole. Fase crescente del volo della 2° generazione carpofaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>